

殺菌剤の作用機構分類 (FRAC による)

FRAC: Fungicide Resistance Action Committee

はじめに :

作用機構分類表は、現在上市されている殺菌剤 (殺バクテリア剤を含む) を作用機構と耐性リスクに従って分類しています。

作用機構コード :

植物病原菌の生合成経路における生化学的作用機構に従って、殺菌剤をアルファベット (A から I と数字を使用) で分類しています。グループ分けは、代謝経路別に「核酸合成 (A)」から始まり「メラニン生合成 (I)」のような二次的代謝で終わります。その後、「宿主植物の抵抗性誘導剤 (P)」、「作用機構不明または未確定 (U、作用機構や耐性のメカニズムの情報が入手できるまでの一時的な分類)」ならびに「多作用点阻害化合物 (M)」を掲載しています。生物由来の殺菌成分は、それぞれの作用経路における主作用機構に従って分類しています。新たに採用された「複数の作用機構を有する生物農薬/生物由来の農薬 (BM)」は、主作用機構が明らかにされていない複数の作用機構が示されている生物由来防除資材について用いられています。

標的部位とコード :

生化学的作用機構が判明している場合にはそれを記載しました。幾つかの例では、正確な標的部位は不明でも、既知の伝達経路や機能的属性の中での分類は可能でした。同一グループ内や他のグループとの関連の中での交差耐性の特性を考慮してグループ分けを行いました。

グループ名 :

グループ名は「The Pesticide Manual」等の文献で認められている化学構造の関連性に基づいています。これらは化学構造、作用部位、グループ内で最初の重要な代表物質などに由来します。

化学グループ :

化学構造に基づきグループ分けをし、命名は IUPAC ならびに Chemical Abstract の名称に準じました。

一般名 :

一般名は BSI/ISO で承認された、あるいは申請中の名称です。一般名は農薬の製品ラベルに有効成分として記載されています。

耐性へのコメント :

耐性機構と耐性リスクについて詳細を示しています。グループ内の 1 化合物が圃場で耐性を示している場合は、必ずしも全てではないが多くの場合グループ内の他の化合物との交差耐性を示すと考えられます。交差耐性の程度はグループ内の化合物と病原菌の種、さらには同一種でも異なることが明らかになりつつあります。特定の病原菌と殺菌剤の耐性と交差耐性の最新の情報については、各国の FRAC 代表者、製品メーカーや植物防疫担当者にお問い合わせください。それぞれの殺菌剤グループの耐性リスクは、FRAC Monograph 1, 2, 3 の原則に従って、「低」、「中」または「高」として推定しています。耐性管理は、殺菌剤固有のリスク、病原菌由来のリスクおよび栽培体系に起因するリスクを考慮して実施されます。 ([FRAC pathogen risk list](#) 参照)

同様な殺菌剤の分類表は FRAG-UK の代表である T.Locke (Fungicide Resistance, August 2001) と P. Leroux (Classification des fongicides agricoles et résistance, Phytoma, La Défense des Végétaux, No. 554, 43-51, November 2002) によって公表されています。

FRAC コード：

交差耐性の特性に従って、殺菌剤グループを数字と文字で分類しています。数字は、原則、当該殺菌剤が上市された順に割り付けています。文字は「P = 宿主植物の抵抗性誘導剤」、「M = 多作用点阻害剤」、そして「U = 作用機構不明（または未確定）」を、「BM = 複数の作用機構を有する生物農薬/生物由来の農薬」を示します。新たな研究による化合物の再分類でコードが失効することがあります。「U-」とされた殺菌剤グループで作用機構が判明した場合、その「U-」コードは新たなグループに再利用されません。そして、新しいコードに再分類されたことを示す注釈を付け加えます。

最新改訂：2017年2月

次回改訂：2018年1月予定

***免責事項**

FRAC コードリストは FRAC の資産であり、著作権法で保護されています。教育目的で FRAC コードリストを使用する場合は FRAC の許可は不要です。営利目的で使用する場合は事前の書面による許可が必要です。FRAC コードリストへの掲載は有効成分の作用機構の科学的評価に基づきます。このリストは農薬製品の使用や効果に関して何ら推薦や保証をするものではありません。

【農薬工業会 注】● **一般名：**

原則 ISO コモンネームを使用しています。農林水産省が別名称を使用している場合にはそれを記載し、ISO コモンネームをカッコ内に併記しました。

FRAC の作用機構分類 (2017年2月)						
作用機構	標的部位とコード	グループ名	化学グループ	一般名	コメント	FRACコード
A 核酸合成	A 1 : RNA ポリメラーゼ I	PA 殺菌剤 (フェニルアミド類)	アシルアラニン類	ベナラキシル ベナラキシルM フララキシル メタラキシル メタラキシルM	作用機構は不明であるが、各種卵菌類(Oomycetes)に対する耐性及び交差耐性が良く知られている。 高い耐性リスク FRAC のフェニルアミド耐性管理ガイドラインを参照。	4
			オキサゾリジノン類	オキサジキシル		
			ブチロラクトン類	オフラセ		
	A 2 : アデノシンデアミナーゼ	ヒドロキシ-(2-アミノ-)ピリミジン類	ヒドロキシ(2-アミノ-)ピリミジン類	ブピリメート ジメチリモール エチリモール	中程度の耐性リスク。 耐性及び交差耐性がうどんこ病菌で知られている。 耐性管理が必要。	8
A 3 : DNA/RNA 生合成 (提案中)	芳香族ヘテロ環類	イソオキサゾール類	ヒドロキシイソキサゾール (ヒメキサゾール)	耐性は知られていない。	3 2	
		イソチアゾロン類	オクチリノン			
A 4 : DNA トポイソメラーゼ タイプ II (ジャイレース)	カルボン酸類	カルボン酸類	オキシロニック酸	殺細菌剤。耐性が知られている。 糸状菌での耐性リスクは不明。 耐性管理が必要。	3 1	
B 細胞骨格とモーター蛋白質	B 1 : β -チューブリン重合阻害	MBC 殺菌剤(メチルベンゾイミダゾールカーバメート)	ベンゾイミダゾール類	ベノミル カルベンダゾール (カルベンダジム) フベリダゾール チアベンダゾール	多くの糸状菌で耐性が知られている。 いくつかの部位で突然変異が認められ、主に β -チューブリンの E198A/G/K、F200Y。 グループ内で正の交差耐性有り。 N-フェニルカーバメート類に負の交差耐性有り。 高い耐性リスク。 FRAC のベンゾイミダゾール耐性管理ガイドラインを参照。	1
			チオファネート類	チオファネート チオファネートメチル		
	B 2 : β -チューブリン重合阻害	N-フェニルカーバメート類	N-フェニルカーバメート類	ジエトフェンカルブ	耐性が知られている。 標的部位でE198Kの突然変異。 ベンゾイミダゾール類と負の交差耐性。 高い耐性リスク。 耐性管理が必要。	1 0
	B 3 : β -チューブリン重合阻害	ベンズアミド類	トルアミド類	ゾキサミド	低から中程度の耐性リスク。 耐性管理が必要。	2 2
チアゾールカルボキサミド類		エチルアミノチアゾールカルボキサミド	エタボキサム			
B 4 : 細胞分裂(提案中)	フェニルウレア類	フェニルウレア類	ペンシクロン	耐性は知られていない。	2 0	

FRACの作用機構分類 (2017年2月)						
作用機構	標的部位とコード	グループ名	化学グループ	一般名	コメント	FRACコード
B 細胞骨格とモーター蛋白質	B5： スペクトリン様蛋白質の非局在化	ベンズアミド類	ピリジニルメチルベンズアミド類	フルオピコリド	耐性は知られていない。	43
	B6： アクチン/ミオシン/フィンプリン機能	シアノアクリレート類	アミノシアノアクリレート類	フェナマクリル	<i>Fusarium graminearum</i> で耐性が知られている。ミオシン-5をコードする遺伝子の標的部位における変異が室内実験で知られている。 中程度から高いリスク。 耐性管理が必要。	47
C 呼吸	C1： 複合体I： NADH酸化還元酵素	ピリミジンアミン類	ピリミジンアミン類	ジフルメトリム	耐性は知られていない。	39
		ピラゾールカルボキサミド類	ピラゾールカルボキサミド類	トルフェンピラド		
	C2： 複合体II： コハク酸脱水素酵素	SDHI(コハク酸脱水素酵素阻害剤)	フェニルベンズアミド類	ベノダニルフルトラニルメプロニル	圃場の菌や実験室の変異株のうち、数種の菌種で耐性が知られている。 <i>sdh</i> 遺伝子の標的部位において、例えば、257、267、272でH/Y(あるいはH/L)やP225Lの突然変異が認められ、それらの変異は菌種に依る。 耐性管理が必要。 中程度から高いリスク。 FRACのSDHI耐性管理ガイドラインを参照。	7
			フェニルオキソエチルチオフェンアミド類	イソフェタミド		
			ピリジニルエチルベンズアミド類	フルオピラム		
			フランカルボキサミド類	フェンフラム		
			オキサチンカルボキサミド類	カルボキシシンオキシカルボキシシン		
			チアゾールカルボキサミド類	チフルザミド		
			ピラゾール-4-カルボキサミド類	ベンゾベンジフルピル ビキサフェン フルキサピロキサド フラメトピル イソピラザム ペンフルフェン ペンチオピラド セダキサン		
			N-メトキシ(フェニルエチル)ピラゾールカルボキサミド類	ビジフルメトフェン		
ピリジンカルボキサミド類	ボスカリド					
ピラジンカルボキサミド類	ピラジフルミド					

FRACの作用機構分類 (2017年2月)						
作用機構	標的部位とコード	グループ名	化学グループ	一般名	コメント	FRACコード
C呼吸	C3: 複合体III:チトクロームbc1 (ユビキノール酸化酵素) Qo部位 (cyt b遺伝子)	QoI 殺菌剤 (Qo阻害剤)	メトキシアクリレート類	アゾキシストロビン クモキシストロビン エノキサストロビン フルフェノキシストロビン ピコキシストロビン ピラオキシストロビン	各種の糸状菌で耐性が知られている。 cyt b遺伝子の標的部位での突然変異(G143A、F129L)や他の作用機構。 QoIグループのすべての剤で交差耐性が知られている。 高い耐性リスク FRACのQoI耐性管理ガイドラインを参照。	11
			メトキシアセトアミド類	マンデストロビン		
			メトキシカーバメート類	ピラクロストロビン ピラメトストロビン トリクロピリカルブ		
			オキシイミノ酢酸類	クレソキシメチルトリフロキシストロビン		
			オキシイミノアセトアミド類	ジモキシストロビン フェナミンストロビン メトミノストロビン オリサストロビン		
			オキサゾリジンジオン類	ファモキサドン		
			ジヒドロジオキサジン類	フルオキサストロビン		
			イミダゾリノン類	フェンアミドン		
			ベンジルカーバメート類	ピリベンカルブ		
			C4: 複合体III:ユビキノ還元酵素 Qi部位	QiI 殺菌剤 (Qi阻害剤)		
スルファモイルトリアゾール	アミスルプロム					
C5: 酸化的リン酸化の脱共役			ジニトロフェニルクロトン酸類	BINAPACRIL (ビナパクリル) メプチルジノカップ DPC(ジノカップ)	耐性は知られていない。 殺ダニ活性も同様。 低いリスク。 しかし、日本では <i>Botrytis</i> 属で耐性が報告。 2012年にU14に分類変更。	29
			2,6-ジニトロアニリン類	フルアジナム		
			(ピリミジノンヒドラゾン類)	(フェリムゾン)		
C6: 酸化的リン酸化、ATP合成酵素の阻害	有機スズ化合物	トリフェニルスズ化合物	有機スズ(酢酸トリフェニルスズ) 有機スズ(塩化トリフェニルスズ) 有機スズ(水酸化トリフェニルスズ)	いくつかの耐性事例が知られている。 低から中程度の耐性リスク。	30	
C7: ATP生産 (提案中)	チオフェンカルボキサミド類	チオフェンカルボキサミド類	シルチオフアム	耐性の報告有り。 低い耐性リスク。	38	

FRACの作用機構分類 (2017年2月)						
作用機構	標的部位とコード	グループ名	化学グループ	一般名	コメント	FRACコード
C 呼吸	C 8 : 複合体III : ユビキノン還元酵素 (Qo 部位、スチグマテリン結合サブサイト)	QoSI 殺菌剤 (Qo 阻害剤、スチグマテリン結合タイプ)	トリアゾロピリミジリアミン	アメトクトラジン	QoI 殺菌剤と交差しない。耐性リスクは中程度から高いと推定。(単一部位の阻害) 耐性管理が必要。	4 5
	D 1 : メチオニン生合成 (<i>cgs</i> 遺伝子) (提案中)	AP 殺菌剤 (アニリノピリミジン類)	アニリノピリミジン類	シプロジニル メパニピリム ピリメタニル	<i>Botrytis</i> 属及び <i>Venturia</i> 属で耐性が知られている。 <i>Oculimacula</i> 属では散発的。 中程度の耐性リスク。 FRAC のアニリノピリミジン耐性管理ガイドラインを参照。	9
D アミノ酸および蛋白質合成	D 2 : 蛋白質合成	エノピラヌロン酸抗生物質	エノピラヌロン酸抗生物質	ブラストサイジン S	低から中程度の耐性リスク。耐性管理が必要。	2 3
	D 3 : 蛋白質合成	ヘキサピラノシル抗生物質	ヘキサピラノシル抗生物質	カスガマイシン	糸状菌及び細菌 (<i>P. glumae</i>) の病原菌で耐性が知られている。 中程度の耐性リスク。 耐性管理が必要。	2 4
	D 4 : 蛋白質合成	グルコピラノシル抗生物質	グルコピラノシル抗生物質	ストレプトマイシン	殺菌剤。耐性が知られている。 高い耐性リスク。 耐性管理が必要。	2 5
	D 5 : 蛋白質合成	テトラサイクリン抗生物質	テトラサイクリン抗生物質	オキシテトラサイクリン	殺菌剤。耐性が知られている。 高い耐性リスク。 耐性管理が必要。	4 1
	E 1 : シグナル伝達 (作用機構不明)	アザ-ナフトレン類	アリルオキシキノリン キナゾリノン	キノキシフェン プロキナジド	キノキシフェンに対する耐性が知られている。中程度のリスク。 耐性管理が必要。 <i>Erysiphe (Uncinula) necator</i> で交差耐性がみられるが、 <i>Blumeria graminis</i> ではみられていない。	1 3
E シグナル伝達	E 2 : 浸透圧シグナル伝達における MAP/ヒスチジンキナーゼ (<i>os-2</i> , <i>HOG1</i>)	PP 殺菌剤 (フェニルピロール類)	フェニルピロール類	フェンピクロニル フルジオキシニル	散発的に耐性がみられる。作用機構は推定。 低から中程度の耐性リスク。 耐性管理が必要。	1 2

FRAC の作用機構分類 (2017年2月)							
作用機構	標的部位とコード	グループ名	化学グループ	一般名	コメント	FRACコード	
E シグナル伝達	E 3 : 浸透圧シグナル伝達におけるMAP/ヒスチジンキナーゼ (<i>os-1</i> , <i>Daf1</i>)	ジカルボキシイミド類	ジカルボキシイミド類	クロゾリネート ジメタクロン イプロジオン プロシミドン ピンクロゾリン	<i>Botrytis</i> 属及び他のいくつかの病原菌で耐性が通常みられる。OS-1 (主に I365S) でのいくつかの突然変異あり。 通常、グループ内化合物での交差耐性有り。 中程度から高い耐性リスク。 FRAC のジカルボキシイミド耐性管理ガイドラインを参照。	2	
F 脂質合成または輸送、細胞膜の構造または機能	F 1 :	以前はジカルボキシイミド類で分類。					
	F 2 : リン脂質合成、メチルトランスフェラーゼ	ホスホロチオレート類	ホスホロチオレート類	EDDP (エジフェンホス) IBP (イプロベンホス) ピラゾホス	特定の糸状菌で耐性が知られている。 低から中程度の耐性リスク。 耐性リスクのある病原菌への使用では、耐性管理が必要。	6	
		ジチオラン類	ジチオラン類	イソプロチオラン			
	F 3 : 脂質の過酸化 (提案中)	AH 殺菌剤 (芳香族炭化水素) (クロロフェニル類、ニトロアニリン類)	芳香族炭化水素	芳香族炭化水素	ビフェニル クロロネブ CNA (ジクロラン) PCNB (キントゼン) テクナゼン トルクロホスメチル	いくつかの糸状菌で耐性が既知。 低から中程度の耐性リスク。 活性スペクトルが異なるため交差耐性のパターンは複雑。	1 4
		複素芳香族	1, 2, 4-チアジアゾール類	エクロメゾール (エトリジアゾール)			
	F 4 : 細胞膜透過性、脂肪酸 (提案中)	カーバメート類	カーバメート類	カーバメート類	ヨードカルブ プロパモカルブ プロチオカルブ	低から中程度の耐性リスク。 耐性管理が必要。	2 8
	F 5 :	以前は CAA 殺菌剤で分類					
F 6 : 病原菌細胞膜の微生物攪乱	微生物 (<i>Bacillus</i> 属)	<i>Bacillus</i> 属および産生された殺菌性リポペプチド類	バチルス ズブチリス QST713 株	耐性は知られていない。 FZB24 株の作用機構として、宿主植物の抵抗性誘導も確認されている。	4 4		
			バチルス ズブチリス FZB24 株				
			バチルス ズブチリス MBI600 株				
			バチルス ズブチリス D 7 4 7 株				
F 7 : 細胞膜の攪乱 (提案中)	植物抽出物	テルペン炭化水素類とテルペンアルコール類とテルペンフェノール類	ゴセイカユブテ (テイーツリー) の抽出物	耐性は知られていない。	4 6		
			植物油類 (混合物) オイゲノール、ゲラニオール、チモール				

FRACの作用機構分類 (2017年2月)						
作用機構	標的部位とコード	グループ名	化学グループ	一般名	コメント	FRACコード
F 脂質合成または輸送、細胞膜の構造または機能	F 8 : エルゴステロール結合	ポリエン	放線菌 Streptomyces natalensis あるいは S. chattanoogensis が産生する両性親媒マクロライド系抗真菌性抗生物質	ナタマイシン (ピマリシン)	耐性は知られていない 農業用、食品用、局所医薬用	4 8
	F 9 : 脂質恒常性および輸送/貯蔵	OSBPI オキシステロール結合蛋白質阻害	ピペリジニルチアゾールイソオキサゾリン類	オキサチアピプロリン	耐性リスクは中程度から高いと推定。(単部位の阻害) 耐性管理が必要。 (以前はU15として分類)	4 9
G 細胞膜のステロール合成	G 1 : ステロール合成のC14位のデメチラーゼ (erg11/cyp51)	DMI 殺菌剤 (脱メチル化阻害剤) (SBI : クラス I)	ピペラジン類	トリホリン	DMI 殺菌剤の殺菌スペクトラムには大きな差がみられる。 各種の菌で耐性がみられる。 いくつかの耐性発現機構は、cyp 51 (erg 11) 遺伝子 (例えば、V136A、Y137F、A379G、I381V)、cyp 51 プロモータ、ABC トランスポータ他での標的部位の突然変異に依ることが知られている。 一般的に DMI 殺菌剤は、同一菌種に対して交差耐性を示すと考えるべきである。 DMI 殺菌剤はステロール合成阻害剤 (SBI) であるが、他の SBI クラスとは交差耐性を示さない。 中程度の耐性リスク。 FRACのSBI耐性管理ガイドラインを参照。	3
			ピリジン類	ピリフェノックス ピリソキサゾール		
			ピリミジン類	フェナリモル ヌアリモール		
			イミダゾール類	イマザリル オキシポコナゾール ペフラゾエート プロクロラズ トリフルミゾール		
			トリアゾール類	アザコナゾール ビテルタノール ブロムコナゾール シプロコナゾール ジフェノコナゾール ジニコナゾール エポキシコナゾール エタコナゾール フェンブコナゾール フルキンコナゾール フルシラゾール フルトリアホール ヘキサコナゾール イミベンコナゾール イブコナゾール メトコナゾール ミクロブタニル ペンコナゾール プロピコナゾール シメコナゾール テブコナゾール テトラコナゾール トリアジメホン トリアジメノール トリチコナゾール プロチオコナゾール		
	トリアゾリンチオン類					

FRACの作用機構分類 (2017年2月)						
作用機構	標的部位とコード	グループ名	化学グループ	一般名	コメント	FRACコード
G 細胞膜のステロール合成	G 2 : ステロール合成における Δ^{14} 還元酵素及び $\Delta^8 \rightarrow \Delta^7$ -イソメラーゼ (<i>erg24</i> , <i>erg2</i>)	アミン類 ("モルフォリン類") (SBI: クラス II)	モルフォリン類	アルジモルフ ドデモルフ フェンプロピモルフ トリデモルフ	うどんこ病菌に対して感受性が低下。 一般に同一グループ内では交差耐性を示すが、他のSBI クラスとは交差耐性を示さない。 低から中程度の耐性リスク。 FRACのSBI 耐性管理ガイドラインを参照。	5
			ピペリジン類	フェンプロピジン ピペラリン		
			スピロケタールアミン類	スピロキサミン		
	G 3 : ステロール合成系のC4位脱メチル化における3-ケト還元酵素 (<i>erg27</i>)	(SBI: クラス III)	ヒドロキシアニリド類	フェンヘキサミド	低から中程度の耐性リスク。 耐性管理が必要。	1 7
G 4 : ステロール合成系のスクワレンエポキシダーゼ (<i>erg1</i>)	(SBI: クラス IV)	チオカーバメート類	ビリブチカルブ	耐性は知られていない。 殺菌及び除草活性有り 医薬用殺菌剤のみ。	1 8	
		アリアルアミン類	ナフチフィン テルピナフィン			
H 細胞壁合成	H 3 :	以前はグルコピラノシル抗生物質で分類			U18 に分類変更	2 6
	H 4 : キチン合成酵素	ポリオキシン類	ペプチジルピリミジンヌクレオシド	ポリオキシン	耐性が知られている。 中程度の耐性リスク。 耐性管理が必要。	1 9
	H 5 : セルロース合成酵素	CAA 殺菌剤 (カルボン酸アミド類)	桂皮酸アミド類	ジメトモルフ フルモルフ ピリモルフ	<i>Plasmopara viticola</i> で耐性が知られているが、 <i>Phytophthora infestans</i> では知られていない。 CAA グループのすべてで交差耐性がみられる。	4 0
			マンデル酸アミド類	ベンチアパリカルブ イプロバリカルブ バリフェナレート マンジプロパミド		
I 細胞壁のメラニン合成	I 1 : メラニン合成の還元酵素	MBI-R (メラニン合成阻害剤-還元酵素)	イソベンゾフラノン	フサライド	耐性は知られていない。	1 6 . 1
			ピロロキノリン	ピロキロン		
			トリアゾロベンゾチアゾール	トリシクラゾール		
	I 2 : メラニン合成の脱水酵素	MBI-D (メラニン合成阻害剤-脱水酵素)	シクロプロパンカルボキサミド	カルプロバミド	耐性が知られている。 中程度の耐性リスク。 耐性管理が必要。	1 6 . 2
			カルボキサミド	ジクロシメット		
	プロピオンアミド	フェノキサニル				
I 3 : メラニン合成のポリケタイド合成酵素	MBI-P (メラニン合成阻害剤-ポリケタイド合成酵素)	トリフルオロエチルカーバメート	トルプロカルブ	耐性は知られていない。	1 6 . 3	

FRACの作用機構分類 (2017年2月)						
作用機構	標的部位とコード	グループ名	化学グループ	一般名	コメント	FRACコード
P 宿主植物の抵抗性誘導	P1:	ベンゾチアジアゾール BTH	ベンゾチアジアゾール BTH	アシベンゾラルSメチル	耐性は知られていない。	P01
	P2:	ベンゾイソチアゾール	ベンゾイソチアゾール	プロベナゾール (抗菌活性も有す)	耐性は知られていない。	P02
	P3:	チアジアゾールカルボキサミド	チアジアゾールカルボキサミド	チアジニルイソチアニル	耐性は知られていない。	P03
	P4:	天然物	多糖類	ラミナリン	耐性は知られていない。	P04
	P5:	植物抽出物	混合物、エタノール抽出物	オオイタドリ抽出液	耐性は知られていない。	P05
	P6:	微生物	バチルス・セレウス菌	バチルス・マイコイデス分離株J	耐性は知られていない。	P06
U 作用機構不明 (リスト中、U番号のないものは再分類された殺菌剤)	不明	シアノアセトアミドオキシム	シアノアセトアミドオキシム	シモキサニル	耐性の報告が有る。低から中程度の耐性リスク。耐性管理が必要。	27
	不明	ホスホナート類	エチルホスホナート類	ホセチル 亜リン酸および塩	いくつかの病原菌で耐性の報告がある。低い耐性リスク。	33
	不明	フタラミン酸類	フタラミン酸類	テクロフタラム (殺菌剤)	耐性は知られていない。	34
	不明	ベンゾトリアジン類	ベンゾトリアジン類	トリアゾキシド	耐性は知られていない。	35
	不明	ベンゼンスルホンアミド類	ベンゼンスルホンアミド類	フルスルファミド	耐性は知られていない。	36
	不明	ピリダジノン類	ピリダジノン類	ジクロメジン	耐性は知られていない。	37
	不明	チオカーバメート	チオカーバメート	メタスルホカルブ	耐性は知られていない。	42
	不明	フェニルアセトアミド	フェニルアセトアミド	シフルフェナミド	<i>Sphaerotheca</i> で耐性。耐性管理が必要。	U06
	アクチンの崩壊 (提案中)	アシルフェニルケトン	ベンゾフェノン ベンゾイルピリジン	メトラフェノン ピリオフェノン	低感受性の小麦うどんこ病菌が発生。中程度の耐性リスク。耐性管理が必要。	U08
	細胞膜の崩壊 (提案中)	グアニジン類	グアニジン類	グアニジン (ドジン)	<i>Venturia inaequalis</i> で耐性が知られている。低から中程度の耐性リスク。耐性管理が必要。	U12
	不明	チアゾリジン	シアノメチレンチアゾリジン	フルチアニル	耐性は知られていない。	U13
	不明	ピリミジノンヒドラゾン類	ピリミジノンヒドラゾン類	フェリムゾン	耐性は知られていない。(以前はC5として分類)	U14
	複合体III: トクローム bcl1、結合部位不明 (提案中)	酢酸4-キノリン	酢酸4-キノリン	テブフロキン	QoI 殺菌剤とは交差耐性がない。耐性リスクは未知だが、中程度のリスクがあると推測される。耐性管理が必要。	U16
	不明	テトラゾリルオキシム	テトラゾリルオキシム	ピカルブトラゾクス	耐性は知られていない。PA、QoI、CAA 殺菌剤とは交差耐性がない。	U17

FRACの作用機構分類 (2017年2月)								
作用機構	標的部位とコード	グループ名	化学グループ	一般名	コメント	FRACコード		
U	不明 (トレハラーゼ阻害)	グルコピラノシル抗生物質	グルコピラノシル抗生物質	バリダマイシン	耐性は知られていない。 トレハロースによる抵抗性誘導提案中。 (以前はH3として分類)	U18		
NC 未分類	不明	種々	種々	マシン油 有機油 炭酸水素カリウム 天然物起源	耐性は知られていない。	NC		
M 多作用点接触活性	多作用点接触活性	無機化合物	無機化合物	銅 (種々の塩)	糸状菌での耐性発現の徴候がなく、一般的に耐性リスクは低いと考えられる。	M01		
		無機化合物	無機化合物	硫黄		M02		
		ジチオカーバメート類及び類縁体	ジチオカーバメート類及び類縁体	ファーバム マンゼブ マンネブ メチラム プロビネブ チウラム チアゾール亜鉛 ジネブ ジラム		M03		
		フタルイミド類	フタルイミド類	キャプタン ダイホルタン (カプタホール) ホルペット		M04		
		クロロニトリル類 (フタロニトリル類)	クロロニトリル類 (フタロニトリル類)	TPN (クロロタロニル)		M05		
		スルファミド類	スルファミド類	スルフェン酸系 (ジクロフルアニド) トリルフルアニド		M06		
		ビスグアニジン類	ビスグアニジン類	グアザチン イミノクタジン酢酸塩/イミノクタジン アルベシル酸塩 (イミノクタジン)		M07		
		トリアジン類	トリアジン類	トリアジン (アニラジン)		M08		
		キノン類 (アントラキノン類)	キノン類 (アントラキノン類)	ジチアノン		M09		
		キノキサリン類	キノキサリン類	キノキサリン系 (キノメチオナート)		M10		
		マレイミド	マレイミド	フルオリミド		M11		
		以前は植物抽出物からのポリペプチド ("BLAD")					BM1に分類変更	M12

FRAC の作用機構分類 (2017年2月)						
作用機構	標的部位とコード	グループ名	化学グループ	一般名	コメント	FRACコード
B M を有する生物農薬<生 物由来の農薬の作用機構	細胞壁、膜を介したイオン輸送における複数の効果；キレート効果	ポリペプチド (植物抽出物より)	ポリペプチド (レクチン)	ハウチワマメ苗木の子葉からの抽出物 (“BLAD”)	耐性は知られていない。(以前は M12 として分類)	B M 0 1
	競合、菌寄生、抗菌作用、溶菌酵素及び誘導抵抗性	微生物(トリコデルマ属菌)	トリコデルマ属菌とその殺菌性代謝産物	トリコデルマ・アトロビリデ SC1 株	耐性は知られていない。	B M 0 2